

EXAMEN MIOFUNCIONAL OROFACIAL- MBGR

Marchesan IQ, Berretin-Felix G, Genaro KF, Rehder MI

Traducido y adaptado al español por Rivera E., Henao J. (Colombia) y Susanibar F. (Perú). Revisado por Parra D.

Nombre: _____ N° _____

Fecha de evaluación: DD / MM / AAAA Edad: ____ Años y ____ meses FN: DD / MM / AAAA

1. POSTURA CORPORAL *Sumar los puntos atribuidos a los ítems: cabeza y hombros (mejor resultado = 0 y peor = 7)* *Observar al paciente en pie y descalzo*

Cabeza [] Sumar los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 4) [Flexión y extensión = sí] [Rotación = no] [Inclinación = tal vez]

Frontal:	(0) normal	(1) rotación D	(1) rotación I	(1) inclinación D	(1) inclinación I
Lateral:	(0) normal	(1) anteriorizada	(1) flexión	(1) extensión	

Hombros [] Sumar los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 3)

Frontal:	(0) normal	(1) elevado D	(1) elevado I
Lateral:	(0) normal	(1) rotación	(1) anteriorizado

Observación: _____

2. MEDIDAS FACIALES, MOVIMIENTOS MANDIBULARES Y OCLUSION

Rostro (mantener los labios en contacto, tomar cada medida 3 veces con el paquímetro y sacar el promedio)

ROSTRO	1ª medida (mm)	2ª medida (mm)	3ª medida (mm)	Promedio (mm)
tercio medio de la cara (glabella al subnasal)				
tercio inferior de la cara (subnasal a gnatio)				
altura de la cara - AL (glabella a gnatio) (suma del tercio medio con el inferior)				
ancho de la cara - AN (prominencias de los arcos zigomáticos)				
canto externo de ojo derecho a la comisura de el labio derecho				
canto externo de ojo izquierdo a la comisura de el labio izquierdo				
labio superior (subnasal al punto más inferior de labio superior)				
labio inferior (de el punto más superior de el labio inferior al gnatio)				

Movimientos Mandibulares y Oclusión (usar el paquímetro y lápiz, tomar cada medida 3 veces y promediar)

Movimientos Mandibulares y Oclusión	1ª medida (mm)	2ª medida (mm)	3ª medida (mm)	Promedio (mm)
Entrecruzamiento vertical - EV (Overbite) (con los dientes en oclusión, marcar en el vestíbulo de los incisivos inferiores la cara incisal de los incisivos superiores y medir la distancia de esa marcación hasta la cara incisal de los incisivos inferiores; en la mordida abierta medir la distancia entre las caras incisales de los dientes incisivos superior e inferior, en el plano vertical, y el resultado obtenido será negativo)				
Entrecruzamiento horizontal - EH (Overjet) (medir la distancia entre las caras incisales de los incisivos superiores e inferiores, en el plano horizontal)				
Lateralización mandibular hacia la derecha (marcar la línea media dentaria de la arcada superior en arcada inferior, llevar la mandíbula para la derecha hasta medir la distancia entre la marcación de la línea media superior)				
Lateralización mandibular hacia la izquierda (marcar a línea media dentaria da arcada superior en arcada inferior, llevar a mandíbula para la izquierda y medir la distancia entre la marcacion y línea media superior)				
Distancia interincisal máxima activa - DIMA (del incisivo central o lateral superior al inferior con máxima abertura de la boca)				
Abertura de la boca (DIMA + EV)				
DIMA con el ápice de la lengua tocando la región alveolar (DIMALA)				
calcular: $\frac{(DIMALA)}{DIMA} \times 100$				

3. EXAME EXTRAORAL Sumar las puntuaciones del análisis facial, labios y masetero (mejor resultado = 0 y peor = 18)

Análisis Facial Sumar los puntos atribuidos al patrón frontal y lateral (mejor resultado = 0 y peor = 5)
Observar al paciente en pie y sin zapatos

Patrón Frontal [] Sumar todas las puntuaciones (mejor resultado = 0 y peor = 3)

Tipo facial (comparar altura (AL) con Ancho (AN):	(0) promedio (AL similar a AN)	(1) largo (AL > AN)	(1) corta (AN > AL)
Proporción facial: (comparar altura de los tercios medio e inferior)	(0) similares	(1) tercio inferior mayor	(1) tercio inferior menor
(comparar canto externo de el ojo a la comisura de el lado D con el lado I)	(0) similares	(1) similares	(1) asimétrica

Patrón lateral [] Sumar todas las puntuaciones (mejor resultado = 0 y peor = 2)

Tipo facial	(0) Tipo I (recto)	(1) Tipo II (convexo)	(1) Tipo III (cóncavo)
Ángulo nasolabial:	(0) próximo a 90° - 110°	(1) agudo (<90°)	(1) obtuso (> 110°)

Observaciones: _____

Labios [] Sumar todas las puntuaciones (mejor resultado = 0 y peor = 10)

Posición habitual:	(0) cerrados (2) entreabiertos	(1) cerrados con tensión (2) cerrados con contacto dentario	(2) a veces abiertos, a veces cerrados (3) abiertos
Mucosa externa:	(0) normal	(1) con saliva	(1) reseca (2) herida
Forma - Superior: - Inferior:	(0) normal (0) normal	(1) en ala de gaviota (1º y 2º arco de Cupido) (1) con eversión discreta	(2) con eversión acentuada
Tamaño del superior:	(0) cubre 2/3 de los incisivos	(1) cubre más que 2/3	(2) cubre menos que 2/3

Observaciones: _____

Masetero [] (mejor resultado = 0 y peor = 2) Se debe realizar a través de la observación visual y palpación

En reposo	(0) relajado	(1) contraído (apretamiento dentario)
Reclutamiento durante la contracción isométrica:	(0) simultáneo	(1) primero lado D (1) primero lado I

Observaciones: _____

4. EXAME INTRAORAL Sumar los puntos de labios, lengua, mejillas, paladar, tonsilas, dientes y oclusión
(mejor resultado = 0 y peor = 57)

Labios [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 5)

Mucosa interna:	(0) normal	(1) con marcas de dientes	(2) heridas
Frenillo superior:	Fijación en el borde alveolar:	(0) adecuada	(1) baja
	Espesura:	(0) normal	(1) alterada (describir):

Observaciones: _____

Lengua [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 17)

Postura habitual:	<input type="checkbox"/> no observable	(1) en el piso	(1) punta baja y dorso alto	(1) interdental:
Simetría:	(0) si	(1) no (describir):		
Grosor:	(0) adecuada	(1) disminuido	(2) aumentado	
Tamaño:	(0) adecuada	(1) aumentada	(grande para la cavidad oral)	
Mucosa:	(0) normal	(1) geográfica	(1) fisurada	(2) con heridas (local)
	(1) marcas de dientes (lugar):	(1) marcadas de aparato (lugar):		
Frenillo:	extensión:	(0) normal	(1) largo (ins, anteriorizada)	(1) corto
	fijación en la lengua:	(0) parte media	(1) delante de la parte media (C. con ins. A)	(2) en el ápice (anquilogl.)
	fijación en el suelo:	(0) entre las carúnculas	(1) entre la cresta alveolar y las carúnculas	(2) cresta alveolar
	otras características:	(0) ausentes	(1) forma corazón protrusión	(1) fibroso

Observaciones: _____

Mejillas [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 8)

Mucosa:	(0) normal	(1) marcas de dientes o del aparato D	(1) línea alba (marca)D	(2) Herida D
		(1) marcas de dientes o del aparato I	(1) línea alba (marca)I	(2) Herida I

Observaciones: _____

Paladar [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 8)

Duro:	Profundidad:	(0) normal	(1) reducida (bajo)	(2) aumentada (alto)
	Ancho:	(0) normal	(1) aumentada (amplio)	(2) reducida (estrecho)
Velo del paladar:	Simetría:	(0) presente	(1) ausente	
	Extensión:	(0) adecuada	(1) largo	(2) corto
Úvula:	(0) normal	(1) alterada (<i>describir</i>):		

Observaciones: _____

Tonsilas Palatinas [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 4)

Presencia:	<input type="checkbox"/> presentes	<input type="checkbox"/> extirpadas	<input type="checkbox"/> no observables
Tamaño:	(0) normal	(1) hipertrofia D	(1) hipertrofia I
Coloración:	(0) normal	(1) hiperemia D	(1) hiperemia I

Observaciones: _____

Dientes [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 5)

Dentadura:	<input type="checkbox"/> decidua	<input type="checkbox"/> mixta	<input type="checkbox"/> permanente
Nº de dientes:	superior D _____	superior I _____	inferior D _____ inferior I _____
Ausencia de dientes:	(0) no	(1) si (<i>elementos</i>): _____	
Salud Oral:	Dientes:	(0) buena	(1) regular (2) mala
	Encías:	(0) buena	(1) regular (2) mala
Uso de prótesis:	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> removible	<input type="checkbox"/> fija <input type="checkbox"/> parcial <input type="checkbox"/> total

Observaciones: _____

Oclusión [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 10)

Línea media:	(0) adecuada	(1) desviada D	(1) desviada I
Clasificación de Angle:	Lado D	(0) Clase I	(1) Clase II div. 1ª (1) Clase II div. 2ª (1) Clase III
	Lado I	(0) Clase I	(1) Clase II div. 1ª (1) Clase II div. 2ª (1) Clase III
Guía de desoclusión:	(0) presente	(1) ausente D	(1) ausente I
Relación horizontal:	(0) adecuada (<i>EH entre 1 a 3mm</i>)	(1) mordida bis a bis (<i>EH = 0mm</i>)	(1) Resalte acentuado (<i>EH > 3mm</i>) (1) mordida cruzada anterior (<i>EH < 0mm</i>)
Relación vertical:	(0) adecuada (<i>EV entre 1 y 3mm</i>)	(1) sobremordida (<i>EV > 3mm</i>)	(1) mordida abierta posterior D (1) mordida abierta anterior (<i>EV < 0mm</i>) (1) mordida abierta posterior I
Relación transversal:	(0) adecuada	(1) mordida cruzada posterior D	(1) mordida cruzada posterior I
Uso de aparato:	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> móvil	<input type="checkbox"/> fijo

Observaciones: _____

5. MOVILIDAD Sumar los puntos de labios, lengua, velo del paladar y mandíbula (mejor resultado = 0 y peor = 54)

Labios [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 16) *Ejecutar con los dientes ocluidos

	Realiza con precisión	Realiza sin precisión	No realiza
Protrusión cerrados *	(0)	(1)	(2)
Retracción cerrados *	(0)	(1)	(2)
Protrusión abiertos *	(0)	(1)	(2)
Retracción abiertos *	(0)	(1)	(2)
Protrusión cerrados hacia la D*	(0)	(1)	(2)
Protruir cerrados hacia la I*	(0)	(1)	(2)
Estallar protruidos (besos)	(0)	(1)	(2)
Estallar retraídos (sonrisas)	(0)	(1)	(2)

Observaciones: _____

Lengua [] Sumar todas las puntuaciones (mejor resultado = 0 y peor = 16)

	Realiza con precisión	Realiza sin precisión	No realiza
Protruir	(0)	(1)	(2)
Tocar el ápice secuencialmente en las comisuras D/I y en los labios S/I	(0)	(1)	(2)
Tocar con el ápice la región alveolar	(0)	(1)	(2)
Tocar con el ápice la mejilla D	(0)	(1)	(2)
Tocar con el ápice la mejilla I	(0)	(1)	(2)
Efectuar el chasquido con el ápice	(0)	(1)	(2)
Succionar la lengua contra el paladar	(0)	(1)	(2)
Vibrar	(0)	(1)	(2)

Observaciones: _____

Paladar blando [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 4)

Emitir "ah" repetidamente	Movimiento adecuado (0)D (0)I	Movimiento reducido (1) D (1) I	Ausencia de movimiento (2) D (2) I
---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Observaciones: _____

Mandíbula [] Sumar todas las puntuaciones (mejor resultado = 0 y peor = 18)

	Adecuada	Reducida	Aumentada	No realiza	Con desvío	Con ruido	Con dolor
Abertura de boca	(0)	(1)	(1)	(2)	(1) D (1) E	(1)	(1)
Valores esperados: niños = 35 a 50mm / adulto = 40 a 55m							
Oclusión de la boca	(0)	-	-	-	(1) D (1) E	(1)	(1)
Lateralizar hacia la D	(0)	(1)	(1)	(2)	-	(1)	(1)
Lateralizar hacia la I	(0)	(1)	(1)	(2)	-	(1)	(1)
Valores esperados: niños (6 a 12 años) = 6 a 10mm / adulto = 8 a 12mm							

Observaciones: _____

6. DOLOR DURANTE LA PALPACIÓN [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 10)

	Ausente	Presente
Temporal	(0) D (0) I	(1) D (1) I
Masetero superficialmente	(0) D (0) I	(1) D (1) I
Trapezio	(0) D (0) I	(1) D (1) I
Esternocleidomastóideo	(0) D (0) I	(1) D (1) I
ATM	(0) D (0) I	(1) D (1) I

Observaciones: _____

7. TONICIDAD [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 6) *Efectuar observación visual y palpación*

	Normal	Disminuido	Aumentado
Labio superior	(0)	(1)	(1)
Labio inferior	(0)	(1)	(1)
Mentón	(0)	(1)	(1)
Lengua	(0)	(1)	(1)
Mejilla derecha	(0)	(1)	(1)
Mejilla izquierda	(0)	(1)	(1)

Observaciones: _____

8. FUNCIONES OROFACIALES Sumar todos los puntos de respiración, masticación, deglución, habla y voz (mejor resultado = 0 y peor = 103)

Respiración [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 7)
Si está alterada, es de origen [] funcional [] estructural [] otra _____

Tipo: (0) medio/inferior (1) medio/superior (1) otro (<i>describir</i>):
Modo: (0) nasal (1) oronasal (2) oral <input type="checkbox"/> silente <input type="checkbox"/> ruidoso
Flujo nasal Al llegar (0) semejante entre las narinas (1) asimetría leve (1) asimetría acentuada (<i>usar espejo</i>) Después de higienizar (0) semejante entre las narinas (1) asimetría leve (1) asimetría acentuada
Posibilidad de uso nasal*: (0) dos minutos o más (1) entre uno y dos minutos (2) menos de un minuto

Observaciones: _____
*para evaluar el uso nasal se le pide al paciente cerrar la boca y respirar normalmente por la nariz, se observa si consigue respirar por 2 minutos manteniendo la boca cerrada o más, si logra esto es señal de que puede respirar por la nariz y no hay obstrucción. Revisar si no puede mantener la boca cerrada por una alteración oclusal.

Masticación: [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 10)
Si está alterada, es de origen [] funcional [] anatómica [] DATM [] otro _____

Masticación Habitual [] (*Utilizar siempre el mismo alimento*)

Incisión: (0) anterior (1) lateral (1) otra:
Trituración: (0) dientes posteriores (1) dientes anteriores (1) con la lengua (0) eficiente (1) ineficiente
Número de ciclos: (<i>ver video</i>): Derecha: 1ª porción: 2ª porción: 3ª porción: Izquierda: 1ª porción: 2ª porción: 3ª porción: Total: 1ª porción: 2ª porción: 3ª porción:
Patrón masticatorio: (0) bilateral alternado (1) bilateral simultáneo (0) unilateral preferencial: (2) unilateral crónico:
Cierre labial: (0) sistemático (1) asistemático (2) ausente
Velocidad: (0) adecuada (1) aumentada (1) disminuida
Masticación ruidosa: (0) no (1) sí
Contracciones musculares inhabituales: (0) ausente (1) presentes (<i>describir</i>):
Tiempo masticatorio (<i>utilizar el mismo patrón de tamaño y tipo de alimento</i>) 1ª porción: _____ segundos 2ª porción: _____ segundos 3ª porción: _____ segundos Media: _____ segundos

Observaciones: _____

Preguntar al paciente:

Lado preferencial de masticación:	<input type="checkbox"/> derecho e izquierdo	<input type="checkbox"/> derecho	<input type="checkbox"/> izquierdo	<input type="checkbox"/> no sabe
Dolor al masticar:	<input type="checkbox"/> ausente	<input type="checkbox"/> derecho	<input type="checkbox"/> izquierdo	
Ruidos en la ATM:	<input type="checkbox"/> ausente	<input type="checkbox"/> derecho	<input type="checkbox"/> izquierdo	

Observaciones: _____

Deglución: Sumar todos los puntos de las tres pruebas (mejor resultado = 0 y peor = 39)

Si se presenta alterada es de origen [] funcional [] estructural [] otro _____

Deglución habitual (sólido) [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 15)

Postura de labios:	(0) cerrados	(1) cerrados parcialmente	(1) labio inferior tocando los dientes superiores	(2) abiertos
Postura de la lengua:	<input type="checkbox"/> no se ve	(0) atrás de los dientes	(1) tocando los dientes	(2) entre los dientes
Retención del alimento:	(0) adecuada	(1) parcial	(2) inadecuada	
Contracción del orbicular:	(0) adecuada	(1) leve	(2) acentuada	
Contracción del mentoniano:	(0) ausente	(1) leve	(2) acentuada	
Movimiento de cabeza:	(0) ausente	(1) presente		
Ruido:	(0) ausente	(1) presente		
Coordinación:	(0) adecuada	(1) se atora	(1) tose	
Residuos después de deglutir:	(0) ausente	(1) presente		

Observaciones: _____

Deglución habitual (líquido - agua) [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 11)

Postura de lengua:	<input type="checkbox"/> no se aprecia	(0) atrás de los dientes	(1) tocando los dientes	(2) entre los dientes
Retención del líquido:	(0) adecuada	(1) inadecuada		
Volumen de líquido:	(0) satisfactorio	(1) aumentado	(1) disminuido	
Contracción del mentoniano:	(0) ausente	(1) leve	(2) acentuada	
Movimiento de cabeza:	(0) ausente	(1) presente		
Ruido:	(0) ausente	(1) presente		
Ritmo:	(0) secuencial	(1) sorbo por sorbo		
Coordinación:	(0) adecuada	(1) se atora	(1) tose	

Observaciones: _____

Deglución dirigida: (líquido - agua) [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 13)

Colocar el agua en la boca y permanecer con ella hasta que el evaluador solicite deglutirla

Postura labial:	(0) cerrados	(1) cerrados parcialmente	(1) labio inferior tocando los dientes superiores	(2) abiertos
Postura de la lengua:	(0) atrás de los dientes	(1) tocando los dientes	(2) entre los dientes	
Retención de líquido:	(0) adecuada	(1) parcial	(1) inadecuada	
Contracción del orbicular de la boca:	(0) adecuada	(1) poca	(2) acentuada	
Contracción del mentoniano:	(0) ausente	(1) poca	(2) acentuada	
Movimiento de cabeza:	(0) ausente	(1) presente		
Ruido:	(0) ausente	(1) presente		
Coordinación:	(0) adecuada	(1) se atora	(1) tose	

Observaciones: _____

Preguntar al paciente

Dificultad para deglutir:	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si (describir):		
Posición de la lengua:	<input type="checkbox"/> atrás de los dientes superiores	<input type="checkbox"/> atrás de los dientes inferiores	<input type="checkbox"/> entre los dientes	<input type="checkbox"/> no sabe

Observaciones: _____

Habla: [] Sumar los puntos de las cinco pruebas (mejor resultado = 0 y peor = 44)

Si se presenta alterada, es de origen [] Fonético [] Fonético/Fonológico [] Fonológico _____

En caso de que sea de origen fonético, es: [] Funcional [] Estructural [] DATM [] neuromuscular [] otras _____

Habla espontánea [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 6)

Utilizar las siguientes preguntas: "dígame su nombre y cuántos años tiene"

"dígame cual es su ocupación (estudia, trabaja)"

"cuénteme sobre algún viaje (paseo) que le gustó"

Omisión:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Sustitución:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Distorsión acústica:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):

Habla automática [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 6)
 Contar del 1 al 20; días de la semana y meses del año

Omisión:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Sustitución:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Distorsión acústica:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):

Nominación de figuras [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 6)
 Utilizar las figuras sugeridas

Omisión:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Sustitución:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):
Distorsión acústica:	(0) ausente	(1) asistemática	(2) sistemática	fono(s):

En caso de distorsión, esta se relaciona a la siguiente alteración de la lengua:

- [] Interdental anterior [] interdental lateral [] ausencia o poca vibración del ápice [] vibración múltiple del ápice
 [] Elevación del dorso [] descenso del dorso [] otras: _____

Coordinación motriz durante el habla [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 8)

Solicitar la emisión rápida y repetida, por 10 segundos, de sílabas y de la secuencia trisilábica.

	Velocidad		Ritmo	
	adecuada	inadecuada	adecuado	inadecuado
[pa]	(0)	(1)	(0)	(1)
[ta]	(0)	(1)	(0)	(1)
[ka]	(0)	(1)	(0)	(1)
[pataka]	(0)	(1)	(0)	(1)

Observaciones: _____

Aspectos generales [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 18)

Saliva:	(0) deglute	(1) acumula en comisura derecha y/o izquierda	(1) acumula en el labio inferior	(2) escupe	(3) babea
Abertura de la boca:	(0) normal	(1) reducida	(1) exagerada		
Posición de la lengua:	(0) adecuada	(1) en el piso	(2) anteriorizada	(2) posteriorizado	(2) punta baja y laterales altas
Movimiento labial:	(0) adecuado	(1) reducido	(1) exagerado		
Movimiento mandibular:	(0) trayectoria adecuada	(1) desviado a la derecha	(1) desviado a la izquierda	(1) anteriorizada	
Resonancia:	(0) equilibrio oronasal	(1) uso reducido nasal	(1) uso excesivo nasal	(1) laringofaríngea	
Precisión articulatoria:	(0) adecuada	(1) imprecisión asistemática		(2) imprecisión sistemática	
Velocidad:	(0) normal	(1) aumentada		(1) reducida	
Coordinación neumofonoarticulatoria:	(0) adecuada		(1) alterada		

En caso de imprecisión está relacionado con:

- [] Tono [] respiración oronasal [] maloclusión [] uso de prótesis [] velocidad del habla
 [] Audición [] uso de medicamento [] cantidad de saliva [] abertura de la boca reducida
 [] Alteración neurológica [] fatiga muscular [] ansiedad/depresión [] otras: _____

Observaciones: _____

Prueba terapéutica (Repetición de sílabas) Solicitar la repetición de sílabas que contengan los fonos alterados, utilizando la vocal "e"
 Esta prueba es utilizada para observar ante la repetición si la producción de la articulación del fono alterado se modifica.

Fonos evaluados	La producción no se altera	La producción mejora	La producción se muestra adecuada

Observaciones: _____

Voz [] Sumar todos los puntos (mejor resultado = 0 y peor = 3)

Solicitar la emisión sustentada de la vocal "a"

Pitch (frecuencia):	(0) adecuado	(1) grave	(1) agudo
Loudness (Intensidad):	(0) adecuado	(1) fuerte	(1) débil
Tipo de voz:	(0) adecuada	(1) alterada	

Nombre: _____ N° _____ Fecha de evaluación: __ / __ / __

Diagnóstico fonoaudiológico y conductas

Valores del Examen Inicial	Reevaluaciones	
	(___ / ___ / ___)	(___ / ___ / ___)
<input type="checkbox"/> POSTURA CORPORAL (mejor resultado = 0 y peor = 7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EXAMENE EXTRAORAL (mejor resultado = 0 y peor = 17)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rostro (mejor resultado = 0 y peor = 5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Labios (mejor resultado = 0 y peor = 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Masetero (mejor resultado = 0 y peor = 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EXAMENE INTRAORAL (mejor resultado = 0 y peor = 57)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Labios (mejor resultado = 0 y peor = 5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lengua (mejor resultado = 0 y peor = 17)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mejillas (mejor resultado = 0 y peor = 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Paladar (mejor resultado = 0 y peor = 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tonsilas Palatinas (mejor resultado = 0 y peor = 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dientes (mejor resultado = 0 y peor = 5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Oclusión (mejor resultado = 0 y peor = 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MOVILIDAD (mejor resultado = 0 y peor = 54)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Labios (mejor resultado = 0 y peor = 16)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lengua (mejor resultado = 0 y peor = 16)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Paladar blando (mejor resultado = 0 y peor = 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mandíbula (mejor resultado = 0 y peor = 18)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DOLOR DURANTE LA PALPACIÓN (mejor resultado = 0 y peor = 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TONICIDAD (mejor resultado = 0 y peor = 6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Labios (superior + inferior) (mejor resultado = 0 y peor = 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mentoniano (mejor resultado = 0 y peor = 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lengua (mejor resultado = 0 y peor = 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mejillas (derecha + izquierda) (mejor resultado = 0 y peor = 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FUNCIONES OROFACIALES (mejor resultado = 0 y peor = 103)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Respiración (mejor resultado = 0 y peor = 7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Masticación (mejor resultado = 0 y peor = 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Deglución (mejor resultado = 0 y peor = 39)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Habla (mejor resultado = 0 y peor = 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Voz (mejor resultado = 0 y peor = 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datos recolectados de exámenes recibidos de otros profesionales _____

Exámenes solicitados: _____

Otras alteraciones: _____

Hipótesis diagnóstica fonoaudiológica _____

Pronóstico: _____

Plan terapéutico: _____

Derivaciones para otros profesionales: _____

Orientaciones: _____

Evaluador(a) responsable: _____

DOCUMENTACIÓN

Fotos sugeridas

Cuerpo		
- frente:	() Sí	() No
- perfil derecho:	() Sí	() No
Cara entera		
- frente: - reposo:	() Sí	() No
- sonrisa:	() Sí	() No
- perfil derecho:	() Sí	() No
Tercio inferior		
- frente:	() Sí	() No
- perfil derecho:	() Sí	() No
Cavidad Oral		
- arco superior:	() Sí	() No
- arco inferior:	() Sí	() No
Oclusión:		
- anterior:	() Sí	() No
- lado derecho:	() Sí	() No
- lado izquierdo:	() Sí	() No
Lengua:	() Sí	() No
Labios:	() Sí	() No
Frenillo lingual (con la boca abierta y el ápice elevado sin tocar ninguna parte de la boca):	() Sí	() No

Otras: _____

Sugerencia para la filmación: filmar: nombre, edad y fecha de evaluación, al igual que pruebas del protocolo de:

Movilidad: () Sí () No	Masticación: () Sí () No	Deglución: () Sí () No	Habla: () Sí () No
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------